

Listado de aves relacionadas con el Sistema Lagunar de La Albuera

Zampullín Común (*Tachybaptus ruficollis*): Estival e invernante. Población reproductora de hasta 30 parejas. Concentraciones post-reproductoras con un máximo de 300 ejemplares.

Somormujo Lavanco (*Podiceps cristatus*): Estival e invernante. Población nidificante de hasta 7 parejas en la laguna Grande.

Zampullín Cuellinegro (*Podiceps nigricollis*): Raro, cita en febrero del 98 y reproducción posible en el 2001.

Cormorán Grande (*Phalacrocorax carbo*): Raro, en paso primaveral.

Avetoro Común (*Botaurus stellaris*): Raro, una sola cita de un ejemplar en paso otoñal.

Martinete Común (*Nycticorax nycticorax*): Raro, cita de tres ejemplares en paso otoñal.

Garcilla Cangrejera (*Ardeola ralloides*): Rara, ejemplar adulto en 1996.

Garcilla Bueyera (*Bubulcus ibis*): Sedentaria, reproducción segura y dormitorio a finales de verano de más de 2.500 ejemplares.

Garceta Común (*Egretta garzetta*): Estival, observación de 25 adultos en época reproductora.

Garza Real (*Ardea cinerea*): Sedentaria, con posible reproducción. Concentraciones en época post-reproductora con máximo de 20 ejemplares.

Cigüeña Negra (*Ciconia nigra*): Paso primaveral, hasta 3 ejemplares.

Cigüeña Blanca (*Ciconia ciconia*): Estival e invernante, en zonas próximas al complejo lagunar, hasta 13 parejas reproductoras. En concentraciones post-reproductoras, hasta 1.197 ejemplares.

Espátula Común (*Platalea leucorodia*): En paso primaveral y otoñal, de uno a dos ejemplares.

Flamenco Común (*Phoenicopterus ruber*): En paso migratorio, hasta 21 ejemplares.

Ansar Común (*Anser anser*): invernante, hasta 200 ejemplares.

Ánade Silbón (*Anas Penelope*): Invernante, con un promedio de 50 ejemplares.

Ánade Friso (*Anas strepera*): Invernante y reproductor con un máximo de 12 parejas. Concentraciones post-reproductoras de hasta 100 ejemplares.

Cerceta Común (*Anas crecca*): Invernante con un máximo de 300 ejemplares.

Ánade Azulón (*Anas platyrhynchos*): Sedentario, reproductor con un máximo de 50 parejas. Concentraciones durante la mancada y época post-reproductora con más de 500 ejemplares.

Ánade Rabudo (*Anas acuta*): Invernante, hasta 113 ejemplares y en paso primaveral.

Cerceta Carretona (*Anas querquedula*): Posible reproducción (observación de cortejo nupcial), con un mínimo de 5 ejemplares.

Cuchara Europea (*Anas clypeata*): Sedentaria, reproducción segura con un máximo de 5 parejas. Población invernante de hasta 200 ejemplares.

Pato Colorado (*Netta rufina*): Invernante con un máximo de 20 ejemplares. Citas de presencia estival sin confirmar reproducción.

Porrón Europeo (*Aythya ferina*): Invernante (máximo 282 ejemplares) y reproducción segura de una pareja.

Porrón Moñudo (*Aythya fuligula*): Invernante con máximo de 50 individuos.

Malvasía Cabeciblanca (*Oxyura leucocephala*): Rara, cita de un ejemplar en diciembre del 89.

Aguilucho Lagunero Occidental (*Circus auruginosus*): Reproducción segura de una pareja. Raro durante el paso otoñal e invernada.

Rascón Europeo (*Rallus aquaticus*): estival sin confirmar reproducción.

Gallineta Común (*Gallinula chloropus*): Estival, reproducción segura con un máximo de diez parejas.

Focha Común (*Fulica atra*): Estival, reproducción con un máximo de 50 parejas, concentraciones de hasta 300 ejemplares a finales de la primavera.

Grulla Común (*Grus grus*): población invernante estable con un promedio entre 600 y 800 ejemplares, alcanzando en algunos años la cifra de 1.000

Cigüeñuela Común (*Himantopus himantopus*): Invernante y estival, con un máximo de 30 parejas reproductoras, concentración post-reproductora de hasta 200 ejemplares

Avoceta Común (*Recurvirostra avosetta*): De paso otoñal e invernante con un máximo de 25 ejemplares.

Alcaraván (*Burhinus oedicnemus*): Sedentario, reproducción segura con un máximo de dos parejas.

Canastera Común (*Glareola pratincola*): Estival, población reproductora que oscila entre 1 y 10 parejas.

Chorlito Chico (*Charadrius dubius*): Estival, reproducción segura (5 parejas constatadas).

Chorlito Grande (*Charadrius hiaticula*): En paso otoñal, hasta 100 ejemplares.

Chorlito Patinegro (*Charadrius alexandrinus*): En paso primaveral, raro.

Chorlito Dorado Común (*Pluvialis apricaria*): Invernante, hasta 376 ejemplares censados en enero. También en paso primaveral.

Chorlito Gris (*Pluvialis squatarola*): En paso primaveral y/o otoñal.

Avefría Europea (*Vanellus vanellus*): Sedentaria, invernante muy abundante, mínimo 2.000 ejemplares y reproducción de hasta 10 parejas.

Correlimos Gordo (*Calidris canutus*): En paso otoñal, con un máximo de 14 ejemplares.

Correlimos Tridáctilo (*Calidris alba*): En paso otoñal

Correlimos Menudo (*Calidris minuta*): En paso otoñal.

Correlimos de Temminck (*Calidris temmickii*): En paso primaveral y otoñal.

Correlimos zarapitín (*Calidris ferruginea*): Raro, cita en el paso otoñal.

Correlimos Común (*Calidris alpina*): En paso otoñal de hasta 100 ejemplares. Invernante escaso.

Combatiente (*Philomachus pugnax*): En paso primaveral y otoñal de hasta 10 ejemplares.

Agachadiza Común (*Gallinago gallinago*): Invernante con observaciones de hasta 40 ejemplares. Observaciones en los meses de agosto y abril.

Aguja Colinegra (*Limosa limosa*): En paso primaveral y otoñal, hasta 50 ejemplares. Invernante escaso, presencia estival sin confirmar reproducción en 1990.

Aguja Colipinta (*Limosa lapponica*): Rara, en paso primavera y posible invernante.

Zarapito Trinador (*Numenius phaeopus*): Raro, en paso primaveral.

Zarapito Real (*Numenius arquata*): Raro, en paso primaveral.

Archibebe Oscuro (*Tringa erythoropus*): Raro, en paso otoñal e invernante.

Archibebe Común (*Tringa totanus*): En paso primaveral y otoñal, hasta 50 ejemplares.

Archibebe Claro (*Tringa nebularia*): En paso primaveral y otoñal, hasta 50 ejemplares.

Andarríos Grande (*Tringa negularia*): En paso otoñal hasta 30 ejemplares, invernante escaso.

Andarríos Bastardo (*Tringa glareola*): En paso primaveral y otoñal. Raro.

Andarríos Chico (*Actitis hypoleucos*): Estival sin confirmar reproducción. En paso otoñal hasta 10 ejemplares.

Gaviota Reidora (*Larus ridibundus*): Presencia estival de inmaduros de hasta 15 ejemplares.

Gaviota Sombría (*Larus fuscus*): Presencia estival de inmaduros de hasta 31 ejemplares. Rara como invernante.

Pagaza Piconegra (*Gelochelidon nilotica*): Estival reproductora. Rara, hasta 9 ejemplares.

Charrancito Común (*Sterna albifrons*): Raro, estival sin confirmar reproducción.

Fumarel Cariblanco (*Chlidonias hybridus*): Estival reproductor, con 3 parejas constatadas. Concentraciones en época post-reproductora, de hasta 25 ejemplares.

Fumarel Común (*Chlidonias niger*): En paso otoñal, de hasta 6ejemplares.